



施設内での

結核 感染拡大を防ぐため

以下の対応についてご理解・ご協力をお願いします。



1 利用者の**胸部エックス線検査の結果**を把握してください。

2 利用者の**健康状態**を観察してください。
(発熱、咳、痰、食欲低下、体重減少、倦怠感、寝汗など)



3 発熱や咳等の症状が**2週間以上続く場合、医療機関を受診**してください。

明石市の結核発生状況




明石市内では新規結核患者の多くが高齢者です。高齢者の場合、咳や痰などの症状が出ない場合が多いです。

2023年 活動性結核患者の年齢割合 (明石市)

高齢者の結核治療には**確実な服薬のためのサポート**が必要です。

薬を**しっかり飲み切る**ためにあかし保健所も支援しています。



結核菌を排菌している患者との接触により感染が広がっています！

症状が出始めた後も介護サービスを利用していた事例

事例01：80歳代女性

- 症状出現 0 日目 咳症状を自覚。
- 4 日目 A病院を受診し、胸部エックス線検査と胸部CT検査により
気管支肺炎と診断。治療開始後も咳症状が続く。
- 123 日目 消化器疾患の疑いで、B病院に入院。
- 161 日目 咳症状の悪化とADLの低下あり。B病院からC病院を紹介受診。
- 164 日目 C病院にて結核を疑い、喀痰検査の結果、**肺結核と診断**。



感染力が高い時期に約5か月間、通所サービスと入所サービスを利用。
80名以上が接触者として健診の対象となる。（職員含む）
このうち、**10名以上が結核菌感染と判明した。**

事例02：80歳代男性

- 症状出現 0 日目 咳症状を自覚。
- 101 日目 咳症状が続く。全身倦怠感、食欲やADLが低下し、寝たきりとなる。
- 110 日目 発熱と呼吸苦が出現し、D病院に入院。
- 111 日目 喀痰検査の結果、**肺結核と診断**。



感染力が高い期間に、週1回の通所サービスを3か月間利用。
10名以上が接触者として健診の対象となる。
このうち、**複数名が結核菌感染と判明した。**



2週間以上症状が持続する場合は

結核を疑って医療機関の受診を促してください！